

**ВЕТРЕНИЧКА КОРЖИНСКОГО***Anemonoides × korsbinskiy*  
Saksonov et Rakov

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

**Природоохранный статус:** 3 — редкий вид. Эндемик Среднего Поволжья. Голоценовый реликт широколиственных лесов, представленный дизъюнктивной популяцией [1, 2]. В Самарской обл. классическое местонахождение вида [3, 4]. Находится под охраной в Ульяновской обл. (категория 1) [5]. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 1/Г — вид, находящийся под угрозой исчезновения [6].

**Распространение.** В Самарской обл. встречается только в Предволжье: Ставропольский р-н [7–11].

Мезофит. Кальцефил. Эфемерофит. Растет в тенистых лиственных лесах по днищам и нижним частям склонов древних долин. Численность невысокая, но стабильная.

**Особенности биологии.** Травянистое многолетнее растение до 20 см выс. Корневище горизонтальное, ползучее. Прикорневых листьев нет. Стебель гладкий с листьями собранными в мутовку на укороченных черешках. Цветок крупный, чаще один, реже два. Листочки околоцветника бледно-желтые, голые, в числе 6–9. Цветет в апреле — мае. Семянки с коротким загнутым носиком, покрыты отстоящими воло-



сками. От родительских видов *A. ranunculoides* L. (с желтыми лепестками) и *A. altaica* (С.А. Мей.) Holub (с белыми лепестками) отличается, прежде всего, цветом околоцветника.

**Лимитирующие факторы.** Не изучены.

**Принятые и необходимые меры охраны.** Охраняется на территории Жигулевского заповедника.

Необходим мониторинг состояния природной популяции, изучение репродуктивных и онтогенетических особенностей вида.



**Источники информации.** 1. Саксонов и др., 2011. 2. Сенатор, Саксонов, 2010б. 3. Саксонов, Раков, 1992. 4. Васюков и др., 2015в. 5. Красная книга..., 2015. 6. Красная книга..., 2007. 7. Саксонов, 2005. 8. Саксонов, 2006. 9. Саксонов, Сенатор, 2012б. 10. Сенатор, Саксонов, 2010в. 11. LE, PVB.

**Составители:** С.В. Саксонов, Н.С. Раков