


ЗЛАТКА ЧЕРНАЯ*Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1758)

Семейство златки — Вурестиде

Природоохранный статус: 4 — неопределенный по статусу вид. Вид на северной границе ареала.

Распространение. Центральная и Южная Европа, Северная Африка, Молдавия, Украина, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Краснодарский и Ставропольский края, Поволжье на север до Саратовской обл. [1]. В Самарской обл. известен с территории Ставропольского (Жигулевский заповедник) [2], Борского (Бузулукский бор; окр. с. Заплавное) и Хворостянского (овраг Свиуха) [3, 4] р-нов.

Особенности биологии. В южных регионах, где вид является вредителем садоводства, биология вида хорошо изучена. Имаго питаются молодыми побегами косточковых плодовых, лёта продолжается все лето. Личинки развиваются на корнях косточковых плодовых деревьев, а также на диком терне. Развитие двух-четырёхлетнее, при температуре ниже 18–20 °С сильно замедляется [1]. В Самарской обл. отмечено



питание имаго на *Prunus fruticosa* [5]. В южных регионах — массовый вид, в Самарской обл. немногочисленен.

Лимитирующие факторы. Не известны. Вероятно, погодные условия.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Бузулукский бор». Специальные меры охраны не разработаны.



Источники информации: 1. Рихтер, 1952. 2. Краснобаев и др., 1992. 3. Кузовенко и др., 2015. 4. Кузовенко и др., 2018. 5. Кузовенко, неопубликованные данные.

Автор: А.Е. Кузовенко, А.В. Бурдаев.