

**ИВА РОЗМАРИНОЛИСТНАЯ***Salix rosmarinifolia* L.


Семейство Ивовые — Salicaceae

**Природоохранный статус:** 3 — редкий вид. В Самарской обл. близ южной границы ареала. Находится под охраной в Саратовской (категория 3) [1] и Ульяновской обл. (категория 2) [2]. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 3/Б — весьма редкий вид, плавно снижающий численность [3].

**Распространение.** Ареал охватывает Среднюю и Восточную Европу, Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию [4]. Впервые для региона указан В.И. Смирновым в 1904 г. [5]. Встречается в Предволжье: Волжский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Безенчукский, Борский, Волжский, Иса克林ский, Камышлинский, Кинельский, Клявлинский, Кошкинский, Красноярский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Шенталинский р-ны [3, 6–18].

Мезофит. Гелиофит. Произрастает по лесным сфагновым и осоково-травянистым болотам, на сплавинах. В типичных местах обитания численность невысокая и, по-видимому, плавно снижается из-за изменения гидрологического режима и уничтожения молодых особей при рекреации и выпасе скота.

**Особенности биологии.** Листопадный двудомный ветроопыляемый кустарник от 0,5 до 2,5 м выс. Листья продолговато-ланцетные, заостренные, цельнокрайние, сверху темно- или серо-зеленые, с коротким пушком, иногда почти голые, снизу серебристо-тонкошелковистые. Сережки небольшие, густоцветковые. Цветет в апреле, плодоносит в мае. Размножение вегетативное и семенное.



**Источники информации.** 1. Красная книга..., 2006. 2. Красная книга..., 2015. 3. Красная книга..., 2007. 4. Скворцов, 1981а. 5. Смирнов, 1904. 6. PVB, SMR, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та. 7. Плаксина, 2001. 8. Калашникова, Плаксина, 2006а. 9. Плаксина, Калашникова, 2006б. 10. Голубая книга..., 2007. 11. Саксонов, 2007б. 12. Саксонов и др., 2007в. 13. Соловьева и др., 2007. 14. Калашникова и др., 2009а. 15. Корчиков и др., 2010б. 16. Реестр особо охраняемых..., 2010. 17. Соловьева, 2010. 18. Саксонов, Сенатор, 2012б.

**Составители:** В.Н. Ильина, О.В. Калашникова, Т.И. Плаксина, В.В. Соловьева



**Лимитирующие факторы.** Положение на границе ареала, узкая эколого-фитоценотическая приуроченность, изменение гидрологического режима водоемов, зарастание болот, выпас скота, рекреация.

**Принятые и необходимые меры охраны.** Охраняется на территории Жигулевского заповедника, НП «Самарская Лука» и НП «Бузулукский бор», ПП «Озеро Молочка» (Иса克林ский р-н), «Гипновое болото» (Кошкинский р-н), «Моховое болото», «Узислово болото» (Сызранский р-н), «Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)» (Камышлинский р-н), «Майтуганские солонцы» (Безенчукский р-н) и др.

Необходима организация ПП в долине р. Уксада (Камышлинский р-н), «Сердовинский бор» (Сызранский р-н), «Дворянский пруд» (Ставропольский р-н), «Берег Чубовского водохранилища» (Кинельский р-н), «Берег Черновского водохранилища» (Волжский р-н) и др. Соблюдение природоохранного режима. Мониторинг состояния природных популяций. Поиск новых мест произрастания с последующей организацией охранного режима.