

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛЕПЫШ*Spalax microphthalmus* Gldenstaedt, 1770

Семейство слепышовые — Spalacidae

Природоохраннй статус: 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. Крайне редкий вид с тенденцией к росту численности. В Самарской обл. — изолированная популяция на восточной границе ареала. Средне-голоценовый, возможно более ранний, реликт. Занесен в Красную книгу Ульяновской обл. (3 — редкий вид, вид на северной границе ареала) [1].

Распространение. Западнопалеарктический вид. На равнинных степях и лесостепях юго-восточной Европы между реками Днестром, Волгой и Северным Кавказом. Локально встречается на Самарской Луке (Ставропольский р-н) [2, 3].

Особенности биологии. Характерный обитатель высокотравных луговых и степных сообществ. Встречается преимущественно по склонам балок и опушкам леса с богатым разнотравьем. Избегает глинистых и песчаных почв, а также мест с повышенной влажностью. Ведет подземный, одиночный образ жизни. Крупными зубами роет длинные ходы, головой выталкивая землю через равные промежутки на поверхность. Глаза скрыты под кожной складкой. Питается сочными корнями и корневи-



щами, делает запасы. Зимой активность снижается, но в спячку не впадает. Самки в марте приносят по 2–5 детенышей. В июне молодые отделяются и живут самостоятельно. В конце 1990-х гг. наметилась тенденция к увеличению численности [4].

Лимитирующие факторы. Территориальная изоляция, сплошная распашка земель.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Жигулевском заповеднике и НП «Самарская Лука». Изменение практики сельскохозяйственного землепользования в НП «Самарская Лука».



Источники информации: 1. Красная книга..., 2015а. 2. Башкиров, 1935. 3. Громов, 1957. 4. Собственные данные авторов.

Авторы: С.В. Симак, В.П. Вехник.