

## РИТИДИАДЕЛЬФУС ТРЕХГРАННЫЙ

*Rhytidiadelphus triquetrus*  
(Hedw.) Warnst

Семейство Гилокомиевые — Hypnaceae

**Природоохранный статус:** 3 — редкий вид.

**Распространение.** Ареал охватывает Европу, Азию и Северную Америку [1]. В Самарской обл. встречается в Предволжье: Ставропольский, Сызранский, Шигонский р-ны и Заволжье: Кинельский р-н [2–10].

Мезоэвтроф. Мезофит [1]. Эпигейд. Произрастает на почве в хвойных лесах. В выявленных местообитаниях численность стабильна.

**Особенности биологии.** Растения мощные, в рыхлых дерновинках или образуют обширные покровы, светло- или желто-зеленые, слабо блестящие. Стебель восходящий до прямостоячего, красный, густо всесторонне облиственный, правильно перисто ветвящийся с горизонтально всесторонне отстоящими веточками до 15 см дл. Листья до 5 мм дл. от основания отстоящие, яйцевидно-треугольные, заостренные, продольно складчатые, пильчатые с двойной жилкой, на верхушке стебля листья скучены и несколько крупнее расположенных ниже. Спорофиты встречаются изредка, коробочка яйцевидная 2–2,5 мм выс. на ножке до 3 см дл., горизонтально наклоненная [2].

**Лимитирующие факторы.** Отсутствие подходящих местообитаний, вырубка лесов,



изменение гидрологического режима местообитаний.

**Принятые и необходимые меры охраны.** Охраняется на территории Жигулевского заповедника, ПП «Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н), «Рачейский бор» (Сызранский р-н), «Муранский бор» (Шигонский р-н).

Необходим мониторинг состояния природных популяций и поиск новых мест произрастания с последующей организацией территориальной охраны, соблюдение природоохранного режима.



**Источники информации.** 1. Рыковский, Масловский, 2004. 2. Мордвинов, 1994. 3. Спиксок..., 1994. 4. Игнатов, Игнатова, 2004. 5. Игнатов и др., 2004. 6. Симонова и др., 2008. 7. Саксонов, Сенатор, 2012. 8. Киселева, Иванова, 2013. 9. Богданова, 2016а. 10. SMR, PVB, Гербарий Самар. гос. соц.-пед. ун-та.

**Составители:** В.В. Соловьева, А.Е. Митрошенкова, Е.С. Корчиков, Я.А. Богданова