КОБЧИК

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)

Семейство соколиные — Falconidae

Природоохранный статус: 2 — вид, сокращающийся в численности. Включен в Красные книги Респ. Татарстан (категория 2) [1], Ульяновской обл. (категория 4) [2], в Постановление Правительства Оренбургской обл. (категория 4) [3].

Распространение. Лесная и лесостепная зона (север степной зоны) от Восточной Европы до Восточной Сибири. В Европейской части России численность неуклонно снижается, распространение становится все более спорадичным [4, 5]. В Среднем Поволжье приурочен к степным и лесостепным зонам. В Предволжье более редок, чем в Заволжье. Наибольшей численности достигает в юго-восточных районах Самарской обл. [6]. Здесь он чаще встречается в степной зоне (Большечерниговский р-н), в Заволжье тяготеет к поймам крупных рек (Самара, Сок, Б. Кинель), в Правоберьжье — гнездится в лесостепи на меловых обнажениях близ р. Волги. В последние 10 лет в Самарской обл. отмечен в Большечерниговском, Волжском (в том числе в НП «Самарская Лука»), Ставропольском (пригородные леса г. Тольятти, Сусканский залив), Кошкинском и Волжском (Яицкие озера) р-нах. В отдельные годы, вероятно, гнездится на территории Жигулевского заповедника.

Особенности биологии. Гнездящийся и пролетный вид. Гнездятся как отдельными парами, так и колониально, часто в колониях грачей (после вылета молодых), но могут использовать вороньи и сорочьи гнезда. Колонии могут существовать много лет подряд. Предпочитает мозаичные биотопы с преобладанием открытых пространств [6]. Прилетает в конце апреля — начале мая. Начало гнездования — во второй половине мая. В кладке 3–4 яйца, птенцов 2–3. При неблагоприятных кормовых условиях наблюдается гибель младших птенцов. Пищевой рацион кобчика составляют насекомые (прямокрылые, стрекозы, жуки), редко мыши, ящерицы, лягушки и птицы. Со второйй половины августа птицы собираются в стаи и отлетают на юг. Пролет кобчиков на Самарской Луке наблюдали 10.09.2017.

Лимитирующие факторы. Сокращение численности по всему ареалу. Химизация сельского хозяйства. Беспокойство в период гнездования.

Принятые и необходимые меры охраны. Места обитания вида охраняются на территории НП «Самарская Лука», Жигулевского заповедника, ППРЗ «Урочище Мулин Дол», «Надежденская лесостепь», «Грызлы — опустыненная степь». Необходимо придание статуса ООПТ КОТР «Сусканский залив», «Поволжский». Запрет охоты на КОТР.



Источники информации: 1. Красная книга..., 2016а. 2. Красная книга..., 2015а. 3. Постановление..., 2018. 4. Рябицев, 2008. 5. Полный определитель..., Ч. 1, 2014. 6. Корякин, Паженков, 2008. Использованы фотоматериалы участников областного фотоконкурса «Большой год» (Е.А. Алмаевой, Л.А. Гараниной, Д.М. Кугувалова, Г.А. Зяткиной, Д.В. Рузова).

Авторы: Г.П. Лебедева, А.Е. Кузовенко.