РЫЖАЯ ЦАПЛЯ

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Семейство цаплевые — Ardeidae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид с естественной низкой численностью, встречающийся на ограниченной территории. Внесен в Приложения двухсторонних соглашений по охране мигрирующих птиц, заключённых Россией с Индией и Японией.

Распространение. Ареал в России — юг европейской части. Во многих частях ареала наблюдается снижение численности [1]. В Среднем Поволжье на гнездовании отмечена только на территории Самарской обл. на КОТР «Сусканский заказник», в гнездовое время встречена на КОТР «Чапаевские лиманы» [2].

Особенности биологии. Новый для области вид, гнездование которого подтверждено участниками областного фотоконкурса «Большой год». Единичные залеты рыжей цапли на нашу территорию в период миграций отмечались в конце XX в. (чучело рыжей цапли добытой на юге области хранится в эколого-биологическом центре г. Самара). Гнездится на заломах тростника на заболоченных территориях с густыми обширными зарослями тростника. Впервые молодая рыжая цапля на КОТР «Сусканский заказник» отмечена в 2015 г. 1 августа, в 2016 г.— 27 августа. В 2017 г. взрослых птиц наблюдали со второй половине июня, а со второй половины июля по вторую половину августа — и молодых птиц. В 2018 г. первая встреча отмечена 21 апреля. Строительство гнезда наблюдали 27 мая и 26 июня, что говорит о реакции этого вида на колебания уровня воды. Молодых, еще не летающих цапель, отметили 18 и 21 июля, а 26 и 28 июля — птенцов, поднявшихся на крыло. В выводке не менее трех птенцов. Последний раз птиц в этом районе наблюдали 25 августа. Далеко от водоемов не улетает, питается в основном мелкой рыбой, часто поедает лягушек, ужей, реже мелких грызунов, насекомых.

Лимитирующие факторы. Сокращение влажных местообитаний, беспокойство со стороны человека и засуха на местах зимовок в Африке. В области уязвим из-за своей редкости, так как обитает на северо-восточной границе ареала. Ведет более скрытный образ жизни, чем другие цапли, избегает близости человека. Гнезда и молодые птенцы подвергаются опасности гибели при палах растительности. Крупная птица, наиболее, чем другие цапли, активна в сумерках, поэтому является более доступной мишенью во время охоты на водоплавающую дичь.

Принятые и необходимые меры охраны. Придание статуса ООПТ КОТР «Сусканский заказник», «Красносамарское» и «Чапаевские лиманы». Запрет пала растительности на водоемах. Запрет всякой охоты на КОТР.

Источники информации: 1. Полный определитель..., 2014. 2. Лебедева, 2016. Использованы фотоматериалы участников областного фотоконкурса «Большой год» (Е. В. Поликаркиной, Г.А. Зяткиной, Д.Г. Михайлюка, М.И. Сосновщенко, Л.А. Гараниной, А.П. Шохина).

Автор: Г.П. Лебедева.