СТРЕПЕТ

Otis tetrax Linnaeus, 1758

Семейство дрофиные — Otididae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. (2009) (категория 5). Занесен в Красные книги России (категория 3) [1], Саратовской обл. (категория 2) [2], в Постановление Правительства Оренбургской обл., (категория 3) [3], в Приложение 2 СИТЕС, Приложение к соглашению России с Индией об охране мигрирующих птиц.

Распространение. Ареал представлен изолированными участками. В России обитает в Приазовье, Среднем и Нижнем Поволжье, Прикаспии и Южном Приуралье [4, 5]. В Среднем Поволжье северная граница ареала проходит по Самарской обл. [6]. В 80-е гг. XIX в. был обычен и гнездился на севере — до широты Сергиевска, на западе, по крайней мере, — до долготы Сергиевска и на востоке — до современных границ области. В засушливые годы осенью с юга в поисках корма к северной границе распространения откочевывали стаи до 200 особей, которые наносили урон озимым. К концу XIX в. участки ковыльных степей и старых залежей сохранились лишь в имениях крупных землевладельцев, численность стрепета заметно сократилась в результате выкашивания и вытаптывания скотом мест, пригодных для гнездования, и сбора яиц пастухами [7]. До конца XX в. встречался до Кинельского и Борского р-нов [8]. В 90-е гг. XX в. и первые годы XXI в. отмечена депрессия численности вида, вызванная бесконтрольным отстрелом и несоблюдением природоохранного законодательства. В настоящее время отмечено возрастание численности. В гнездовой период найден в Алексеевском, Большеглушицком и Большечерниговском р-нах, осенние скопления более 50 особей наблюдали в Большечерниговском р-не в первой декаде сентября [9, 10, 11].

Особенности биологии. Обитатель степей, лугов, залежей и пашен. Перелетный вид. Прилетает во второй половине апреля. В брачный период характерен ток. Кладка с начала мая из 3–5 яиц. Питание смешанное. Летом животным кормом — насекомыми, иногда мелкими позвоночными; весной и осенью — преимущественно растительным — семенами, всходами и бутонами. Птенцов выкармливают насекомыми. Вне периода размножения держатся группами. Отлет на зимовку в сентябре–октябре.

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания (распашка целинных степных участков, нефтедобыча), браконьерство.

Принятые и необходимые меры охраны. Места гнездования вида сохраняются на ООПТ «Урочище Мулин Дол», КОТР «Урочище Грызлы», «Костинские лога». Необходим запрет на КОТР. Создание условий для размножения в неволе и последующего выпуска в природу.

Источники информации: 1. Красная книга..., 2001а. 2. Красная книга..., 2006а. 3. Постановление..., 2018. 4. Рябицев, 2008. 5. Коблик, 2001. 6. От королька..., 2017. 7. Карамзин, 1901. 8. Красная книга..., 2009а. 9. Кузовенко, 2015. 10. Шаронова, 2015. 11. Лебедева, 2015.

Авторы: А.Е. Кузовенко, Г.П. Лебедева.